



Vaccinaties bij chemotherapie of immunotherapie behandeling

Voor wie is deze folder?

Deze folder is bestemd voor patiënten die op dit moment behandeld worden met chemotherapie of immunotherapie vanwege een oncologische of hematologische aandoening. Deze folder biedt informatie over de vaccinatie tegen de griep en pneumococcon. Patiënten met een verminderde afweer hebben een verhoogd risico op het krijgen van griep. Als zij griep hebben, lopen zij ook meer kans op het krijgen van ernstige complicaties ten gevolge van de griep. Dit geldt ook voor patiënten die met chemotherapie of immunotherapie behandeld worden. Door preventieve vaccinatie (griep prik) tegen het griepvirus (influenza), kan het optreden van een ernstige griep meestal worden voorkomen.

Wanneer vaccineren?

Vanwege de invloed van chemotherapie of immunotherapie op de afweer, is vaccinatie bij patiënten die behandeld worden met chemotherapie of immunotherapie meestal iets minder effectief dan bij gezonde mensen. Deze griep prik beschermt dus niet altijd tegen griep. Dit is echter geen reden om de vaccinatie niet te doen. Een uitzondering is de patiëntengroep die behandeld wordt met rituximab (Mabthera). Bij deze groep patiënten is vaccineren niet zinvol tot zes maanden na de laatste toediening van rituximab. Vanaf oktober wordt ieder jaar gevaccineerd tegen de gebruikelijke seizoensgebonden griep. Hiervoor wordt een geïnactiveerd griepvaccin gebruikt. Deze is veilig voor patiënten met een verminderde weerstand. Het optimale tijdstip van de vaccinatie gedurende de behandeling met chemotherapie of immunotherapie is nog niet helemaal duidelijk. Met de gegevens die nu bekend zijn, lijkt het beste moment van vaccinatie ongeveer vier dagen na de kuur.

Pneumococcon

Vanaf 2020 wordt de pneumococcon vaccinatie aan een deel van de patiënten, geselecteerd op leeftijd, aangeboden. Indien dit voor u van toepassing is wordt u hierover door de huisarts geïnformeerd. Voor de pneumococcon vaccinatie gelden dezelfde voorwaarden als voor de griep vaccinatie, ongeveer 4 dagen na de kuur. De vaccinatie dient iedere 5 jaar herhaald te worden.

Vragen?

Heeft u hierover vragen? Dan kunt u ze stellen aan de oncologie verpleegkundige, verpleegkundig specialist oncologie of uw behandelend arts.