



# Plexus coeliacus Blokkade

Deze folder is bestemd voor patiënten die in aanmerking komen voor een plexus coeliacus blokkade. Deze behandeling kan worden toegepast bij ernstige pijnklachten ten gevolge van kanker van de bovenbuikorganen zoals de alvleesklier, de maag en de lever, en soms bij ontsteking van de alvleesklier. Het betreft een blokkade van een zenuwnetwerk in de bovenbuik. Dit zenuwnetwerk wordt in medische termen 'plexus coeliacus' genoemd. Bij de meeste patiënten treedt na de blokkade een goede pijnvermindering op. Voor deze behandeling wordt u gedurende één tot drie dagen opgenomen.

In deze folder kunt u lezen wat de behandeling inhoudt en wat van u wordt verwacht.

## Vorbereidingen

Gebruikt u antistollingsmiddelen (bloedverdunners)? De pijnbehandelaar zal met u bespreken of en hoe lang van tevoren u moet stoppen met de bloedverdunnende medicijnen en of u hiervoor tijdelijk vervangende medicatie krijgt.

Ook zal de pijnbehandelaar met u bespreken of u nuchter moet zijn voor de behandeling.

## Waar moet u zich melden?

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de Dagbehandeling Chirurgie van Gelre ziekenhuizen Apeldoorn.

## Duur opname

Voor deze ingreep wordt u opgenomen en moet u meestal 1 nacht blijven.

## De behandeling

De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving eventueel aangevuld met lichte sedatie. Dit wordt van te voren met u besproken. Voor de behandeling krijgt u altijd een infuus en extra vocht toegediend.

Tijdens de behandeling ligt u op uw buik. Onder röntgendoorlichting worden twee naalden via de rug ingebracht. Met contrastvloeistof en eventueel stimulatie van de zenuwen worden de posities van de naalden gecontroleerd. Vervolgens wordt de behandelvloeistof rondom het zenuwnetwerk gespoten en wordt u af en toe gevraagd om kort de benen aan te spannen ter controle. De totale behandeling duurt ongeveer een half uur. Na de behandeling moet u nog een half uur op de buik blijven liggen om te zorgen dat de vloeistof op de juiste plaats blijft. Na een half uur kunt u weer gaan liggen zoals u dat zelf wilt.



## Complicaties

De behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd, toch bestaat er een geringe kans op het optreden van complicaties:

- Na de behandeling kan de pijn sterk verminderd zijn en zal daarom de pijnmedicatie aangepast moeten worden. Te snel afbouwen van medicatie kan wat onthoudingsverschijnselen geven zoals rillen, grieperig gevoel etc. Volg daarom altijd het medicatieadvies van u arts op.
- Het tijdelijk optreden van diarree is een vaak voorkomende bijwerking van deze behandeling.
- U kunt de eerste weken na de behandeling bij plotseling rechtop komen, even duizelig zijn.
- Een complicatie die zeer zelden voorkomt is een dwarslaesie (gedeeltelijke verlamming van beide benen). De kans daarop is uitermate gering.

## Resultaat

Het resultaat van de blokkade is pas één of twee dagen na de behandeling duidelijk. Bij de meerderheid van de patiënten treedt na de blokkade een goede pijnvermindering op. Het effect van de behandeling houdt gemiddeld enkele maanden aan en kan zonodig herhaald worden. In een aantal gevallen zal een aanvullende behandeling nodig zijn.

## Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel ze dan gerust aan uw pijnbehandelaar via de polikliniek pijnbestrijding.

### Gelre ziekenhuizen Apeldoorn

- Polikliniek Pijnbestrijding
- maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur
- Tel: 055 - 581 18 00