



Eso-sponge

Uw arts heeft voorgesteld om een Eso-sponge bij u te doen. In deze folder leest u wat de behandeling inhoudt. Ook wordt beschreven wat u tijdens en na de behandeling kunt verwachten.

Wat is het doel van deze behandeling?

De behandeling is bedoeld voor holtes in de borstholtes, meestal ontstaan als complicatie van een slokdarmoperatie. Tijdens de ingreep wordt er een spons in deze holte geplaatst met een vacuüm-systeem. De spons zuigt ontstekingsvocht en pus op zodat de holte langzaam kan genezen (kleiner wordt). De spons werkt 3 tot 4 dagen, een volledige behandeling bestaat meestal uit meerdere nieuwe sponsplaatsingen.

Vervoer naar en van het ziekenhuis

Tijdens het onderzoek krijgt u medicatie waardoor u minder snel reageert. U mag daarom na het onderzoek niet zonder begeleiding van een familielid of een ander naar huis. Ook mag u na het onderzoek de eerste 24 uur niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer (Het is wettelijk niet toegestaan om op de dag van de behandeling zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.). U bent de eerste 24 uur na de ingreep niet verzekerd voor dergelijke verkeersongevallen en Gelre Ziekenhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld. Het gebruik van een taxi, zonder begeleiding, is ook niet toegestaan. Drink na het onderzoek de eerste 24 uur geen alcohol, neem geen belangrijke beslissingen en bedien geen gevaarlijke machines.

Uw begeleiding tijdens het onderzoek

Na het onderzoek mag u niet alleen naar huis. Dit betekent dat u enkel onder begeleiding van een contactpersoon de afdeling mag verlaten. U mag dus ook niet alleen naar beneden. Ook mag u niet alleen met de taxi naar huis. Als er een contactpersoon bij is, mag u wel met de taxi of het openbaar vervoer naar huis. Uw contactpersoon moet u begeleiden tot u thuis bent.

Als er géén begeleiding naar huis is na het onderzoek: dan kan het onderzoek niet met een roesje uitgevoerd worden en dan doen we het zonder roesje.

U heeft een persoon meegenomen voor uw begeleiding naar huis na het onderzoek. Als u door de verpleegkundige wordt opgehaald uit de wachtkamer voor het onderzoek, dan krijgt uw begeleider uitleg én het tijdstip waarop hij/zij in de uitslaapkamer aanwezig moet zijn. Uw begeleider kan tot die tijd wachten in de wachtkamer of in de centrale hal. Laat uw begeleider een rolstoel meenemen vanuit de centrale hal (borg € 1,-). Op de locatie Zutphen hoeft u geen borg voor de rolstoel mee te nemen. Door de medicatie die u tijdens het onderzoek krijgt, kunt u zich minder fit voelen. Daarom moet u in een rolstoel vervoerd worden naar de auto. Is het voor uw begeleider niet mogelijk om gedurende het onderzoek te blijven? Dan nemen wij voordat het onderzoek start telefonisch contact op met hem/ haar. Het is de bedoeling dat uw begeleider binnen 30 minuten in het ziekenhuis aanwezig kan zijn. Dit is in verband met het geven van de voorlopige uitslag van het onderzoek door de verpleegkundige of eventueel de arts. Zonder contact vooraf met uw begeleider kan het onderzoek niet doorgaan. Indien u bent opgenomen in het ziekenhuis hoeft de begeleiding niet aanwezig te zijn en zult u de uitslag te horen krijgen wanneer u weer terug bent op de afdeling.




De Procedure

Onderzoek

Eerst verwijdert de MDL-arts de oude spons. De oude spons wordt voorafgaand aan het onderzoek op de Endoscopie-afdeling via het slangetje dat eraan zit al voorbereid op de verwijdering. Dit doet geen pijn. U gaat vervolgens naar de behandelkamer waar u een slaapmiddel (roesje) krijgt voor de behandeling zelf.

Tijdens het onderzoek schuift de MDL-arts de endoscoop (kijkslang) voorzichtig via de mond naar binnen. Wanneer de MDL-arts de holte heeft gevonden, bekijkt hij/zij eerst het wondgebied om het herstel en de grootte van de spons te bepalen. Aansluitend wordt indien nodig een nieuwe spons geplaatst.

Het succespercentage bij complicaties na slokdarmchirurgie is 70 – 80%, soms is er dus onvoldoende effect.



Na het onderzoek

De uitslag

Na afloop van het onderzoek wordt u naar de nazorg gebracht. Als u bent bijgekomen wordt u op de Endoscopie-afdeling of later op de polikliniek ingelicht over de bevindingen tijdens het onderzoek. U krijgt de uitslag direct op papier mee.

Complicaties

De kans bestaat dat door het verwijderen van de spons een lichte bloeding ontstaat. Gebeurt dit tijdens het onderzoek, dan zal de endoscopist dit gelijk verhelpen. Indien u na het onderzoek last krijgt van een nabloeding volgt u dan de leefregels van de nazorg brief.



Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder vragen? Neem dan contact op met de arts die dit onderzoek met u heeft afgesproken. Of kijk op www.gelreziekenhuizen.nl