



Picoprep® bij faecale impactie

Aandachtspunten

- Deze dagen geen magnesiumoxide tabletten of macrogol geven, hervatten als er geen Picoprep meer gegeven wordt
- Gebruik dit middel niet samen met onderstaande middelen:
 - sommige antibiotica, zoals ciprofloxacin, norfloxacin en pipemidinezuur

Uitvoering

| Dag 1 | |
|---|---|
| Voeding: | Normaal ontbijt, lichte lunch, kleine avondmaaltijd |
| 9.00 of 10.00 uur | Hoeveelheid Picoprep afhankelijk van leeftijd |
| Hierna elk uur helder vloeibaar (bijv. water, thee, appelsap, dubbelfris, ice tea, ranja, heldere bouillon), tot volgende gift Picoprep. Hoeveelheid afhankelijk van leeftijd | |
| 15.00 of 16.00 uur | Hoeveelheid Picoprep afhankelijk van leeftijd |
| Vervolgens elk uur helder vloeibaar tot circa 21 of 22 uur. Hoeveelheid en tijdstip van medicatie inname en eindtijd afhankelijk van leeftijd | |

| Dag 2 | |
|---|---|
| Voeding: | Normaal ontbijt, lunch, avondmaaltijd |
| 9.00 of 10.00 uur | Hoeveelheid Picoprep afhankelijk van leeftijd |
| Hierna elk uur helder vloeibaar (bijv. water, thee, appelsap, dubbelfris, ice tea, ranja, heldere bouillon), tot volgende gift Picoprep. Hoeveelheid afhankelijk van leeftijd | |
| 15.00 of 16.00 uur | Hoeveelheid Picoprep afhankelijk van leeftijd |
| Vervolgens elk uur helder vloeibaar tot circa 21 of 22 uur. Hoeveelheid en tijdstip van medicatie inname en eindtijd afhankelijk van leeftijd | |

| Dag 3 | |
|-------|--|
| Rust | |

| Dag 4 | |
|---|--|
| Eventueel nogmaals 2 of 1 zakje Picoprep (volgens schema hierboven) | |

| Leeftijd | 9.00 uur | 15.00 uur | Hoeveelheid vocht per uur |
|----------|----------|-----------|---------------------------|
| 1-2 jaar | ¼ zakje | ¼ zakje | 50 - 75 ml |
| 2-4 jaar | ½ zakje | ½ zakje | 75 -125 ml |
| 4-9 jaar | 1 zakje | ½ zakje | 150 -175 ml |
| > 9 jaar | 1 zakje | 1 zakje | 200 -250 ml |